

浴用にがり

バスタラソ 説明資料



バスタラソ担当
営業本部長 畑野 尚昭
MOBILE: 090-4657-9811
MAIL: hatano@susainc.com

マグネシウム欠乏症の原因

1、食事によるミネラル摂取の減少

野菜嫌い

魚介嫌い（肉食偏重）

野菜のミネラル含有量減少

人工的要因

化学肥料、

水耕栽培、

養殖、

人工餌、

淡水養殖

人工塩（ほぼナトリウム）

2、ストレスや発汗による水溶性ミネラルの喪失



マグネシウムを始めとする
他の微量ミネラルの欠乏



マグネシウム 欠乏症
（心臓病、うつ、不眠、2型糖尿病など）

マグネシウムの日本人の食事摂取基準と 推定摂取量の比較

男女30～49歳、摂取量 平均値(mg/日)

対象 年度	食事摂取基準 1 推奨量		国民健康・栄養調査 2 推定摂取量		推奨量に対する 不足量	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
2001			267～277	228～248		
2002			255～281	228～249		
2003			258～270	219～244		
2004			247～261	218～239		
2005	370	280	249～265	221～238	105～121	42～59
2006			252～262	218～234	108～118	46～62
2007			250～257	219～224	113～120	56～61
2008			242～245	204～226	125～128	54～76
2009			246～254	208～222	116～124	58～72
2010	370	290	240～244	208～213	126～130	77～82
2011			231～239	200～212	131～139	78～90
2012			236～248	209～214	122～134	76～81
2013			243	204～211	127	79～86
2014			231～244	199～206	126～139	84～91
2015	370	290	243～249	205～219	121～127	71～85
2016			234～240	209～210	130～136	80～81
2017			234～239	203～213	131～136	77～87

比較表「平成29年「国民健康・栄養調査」の結果」、
「日本人の食事摂取基準（2015年版）」

関連資料：<https://www.ncgmkohndai.org/水-電解質/マグネシウム欠乏/>

入浴による皮膚からのマグネシウム補給



メリット : かんたん、日常的、安価、健康的

原理 : フランスのタラソテラピーの理論

『12分以上浸かっていると、ミネラルが皮膚を通して体に入ってくる』

関連論文 : https://www.jstage.jst.go.jp/article/onki1962/63/4/63_4_181/article/-char/ja/



海水のミネラルバランスで体調回復

マグネシウムを始めとする

海水に含まれるすべてのミネラルを
からだ全体に

しかも、ゆっくり吸収されるから経口サプリメントよりずっと安心

関連論文 : <http://mag21.jp/contents/523>

バスラソだけのひみつ

完全天日製法

バスラソのにがりには、火入れを行わない



非加熱製法（50℃以下の完全非加熱製法）



天然成分そのまま（海水を60倍濃縮！）


他のにがり入浴剤にない効果が続々口コミで！
疲労回復、肩こり、アトピー、毛髪などなど

（個人の感想です）

関連資料：https://www.jstage.jst.go.jp/article/nskkk1995/49/7/49_7_437/pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/~yamao/lecture4/ueda_sotsuron.pdf
<https://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu/iken/pdf/0629-acrylamide.pdf>



商標申請中



製造販売：Medical IP Creator 株式会社Susa Inc.
東京都港区白金2-5-12
製造場所：岡山県総社市窪木902-3